Коротка характеристика продукту

1. Назва

Новібак рідкий

2. Склад

100 г добавки містить:

- пропіонова кислота (Е 280) – 33,0 г;
- мурашина кислота (Е 236) – 15,0 г;
- форміат натрію (Е 237) – 10,7 г;
- жирні кислоти – 500,0 мг;
- ароматчие з'єднання – 300,0 мг;
- пропіленгліколь –2,5 мг;
- естеріфіцірованний Бутирін –7 г;
- емульгатор – 2,5 г;
- БГА (бутильований гідроксіанізол) – 300,0 мг;
- вода – 28,2 г.

3. Форма випуску

Рідина темно-коричневого кольору із слабким кислим запахом.

4. Фармакологічні властивості

Добавка є одночасно бактерицидним і фунгіцидним засобом використовується для приготування кормів та кормової сировини. Забезпечує як протигрибкову так і ефективну антибактеріальну дію.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Сільськогосподарські тварини та птиця.

5.2 Показання до застосування

Знищення цвілі та патогенних бактерій в кормах, кормовій сировині і воді. Продовження термінів зберігання кормів та кормової сировини за рахунок зниження кислотності середовища.

Профілактика зараження тушок патогенною мікрофлорою під час їх потрошіння.

Активізація дії харчових ферментів, покращення травлення ті засвоєння протеїнів.

Профілактика розладів травлення кормового характеру.

5.3 Протипоказання

При застосуванні у відповідності з рекомендаціями виробника протипоказів немає.

5.4 Особливі застереження при використанні

Вводити добавку відповідно до встановлених норм годівлі. Необхідно дотримуватись загальноприйнятих санітарно-гігієнічних правил. Зважаючи на високу концентрацію активних летких компонентів в цій суміші, рекомендується обережно поводитися з добавкою, уникаючи контакту з очима, шкірою і слизовою оболонкою.

5.5 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Використовується для приготування комбікормів та кормової сировини.

5.6 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Невідома.

5.7 Дози і способи введення тваринам різного віку

Змішують із кормом з розрахунку 1-3 кг на одну тонну комбікорму в літній період та 1-2 кг на одну тонну комбікорму в зимовий період.

5.8 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Дотримуватись умов по застосуванню.

5.9 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Дотримуватись загальноприйнятих санітарно-гігієнічних норм та правил.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Термін придатності

Термін придатності – два роки.

6.2 Особливі заходи зберігання

Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 0°С до 18°С.

6.3 Природа і склад контейнера первинного упакування

Пластмасові діжки або контейнери по 0,5; 1,0; 5,0; 25,0; 200,0 та 1000 л.

6.4 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним продуктом або із його залишками

Залишки продукту знешкоджують 5%-м розчином їдкого лугу, водною суспензією гашеного або хлорного вапна (суспензія у воді 1:3). Знешкоджені залишки продукту зливають до ями глибиною не менше 0,5м, розташовану на віддалі від джерел водопостачання, водоймищ, річок.

7. Назва та місце знаходження власника реєстраційного посвідчення та виробника

ІННОВ АД НВ/СА	INNOV AD NV/SA
Постбаан 69	Postbaan 69
В-2910 Ессен, Бельгія	B-2910 Essen, Belgium