

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Авінью, Avinew – вакцина жива ліофілізована проти ньюкаслської хвороби, зі штаму VG/GA.

Склад

Одна доза вакцини містить:

активнодіюча речовина:

атенуйований вірус ньюкаслської хвороби, штам VG/GAне менше $10^{5.5}$ EID₅₀*;
наповнювач..... додають до утворення 1 дози.

*Цей титр є еквівалентом мінімум 15 PD₉₀ на дозу.

Фармацевтична форма

Ліофілізат.

Імунобіологічні властивості

Вакцина стимулює активну імунізацію птиці проти ньюкаслської хвороби.

Період утворення імунітету: 14 діб після вакцинації.

Тривалість імунітету: до 6 тижнів.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Вакцина призначена для вакцинації птиці проти ньюкаслської хвороби.

Протипоказання

Не вакцинувати червоних куріпок.

Застереження при застосуванні

Вакцинують лише клінічно здорових тварин.

Під час вакцинації необхідно дотримуватися правил асептики.

Під час приготування вакцинного розчину застосовувати лише стерильне обладнання, що не містить дезінфектантів та антисептичних засобів.

Взаємодія з іншими засобами

Не виявлено.

Особливі вказівки під час несучості

Не вимагаються.

Спосіб застосування та дози

Вакцину застосовують у відповідності до наступної схеми:

- первинна вакцинація у добовому віці;
 - ревакцинація:
 - *бройлери*: можлива ревакцинація за 2-3 тижні.
 - *майбутнє батьківське поголів'я та несучки*: ревакцинація за 14-21 добу та 7-8 тижнів;
- потім, ревакцинація інактивованою вакциною перед початком періоду несучості.

Ця стандартна схема вакцинації може бути адаптована згідно місцевих епізоотологічних умов.

Вакцину Авінью можна застосовувати одночасно з інактивованою вакциною.

Індивідуальна вакцинація

- інтраокулярний метод:

нанести краплю розчину на кон'юнктиву ока кожної птиці, зачекати доки крапля розтечеться по кон'юнктиві та відпустити птицю.

- назальний метод (лише для курчат добового віку)

занурте дзьоб у розчин до рівня ніздрів, так щоб розчин міг проникнути крізь носові канали.

Масова вакцинація

- оральний метод (починаючи з 4 доби від народження)

розчинити вакцину в об'ємі питної води, який споживає птиця протягом однієї - двох годин.

Не напувати птицю протягом двох годин перед вакцинацією.

- спрей (респіраторний метод)

розчин вакцини розпилити на птицю, використовуючи спреєр, що працює під тиском та виробляє мікро-краплі.

Побічні ефекти

Не виявлені.

Період виведення (каренції)

Відсутній.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП

Під час вакцинації дотримуються загальних правил асептики та антисептики.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Знищити використані флакони та залишки вакцини відповідно до вимог місцевого законодавства.

Термін придатності

19 місяців.

Термін придатності після першого відкриття: використати відразу.

Термін придатності після розведення: використати відразу.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати та транспортувати за температури від 2 °С до 8 °С у місці, захищеному від світла та недоступному для дітей.

Упаковка

Природа первинного упакування вакцини:

скляні флакони по 1000 доз та 2000 доз.

Пластикова упаковка містить по 10 скляних флаконів.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

МЕРІАЛ, 29 авеню Тоні Гарнієр – 69007 Ліон, Франція.

Назва та місцезнаходження виробника

МЕРІАЛ (Лабораторія Порте дес Алпес), руе де л'Авіеший – 69800 Сейнт Прієст, Ліон, Франція.

Правила відпуску

За рецептом.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення реклаमाцій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.