

Енроксил® 10 %
(розчин для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Прозорий розчин жовтого кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

енрофлоксацин – 100 мг.

Допоміжні речовини: спирт бензиловий, гіпромелоза, калію гідроксид, вода.

Фармакологічні властивості

Енрофлоксацин належить до групи фторхінолонів нового покоління, проявляє протимікробну дію шляхом гальмування активності ферменту ДНК-гірази, який є надзвичайно важливим каталізатором реплікації ДНК у бактеріальній клітині, запобігає, таким чином, розвитку паралельної резистентності. Він ефективно діє проти більшості патогенних мікроорганізмів: *Mycoplasma spp.*, *E. coli*, *Salmonella spp.*, *Campylobacter spp.*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Bordetella spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Vibrio parahaemolyticus*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.* і ентерококи.

Застосування

Лікування свійської птиці (кури-бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк, індики) при захворюваннях травного каналу та органів дихання (колі-інфекція, пастерельоз, інфекційний пташиний риніт, сальмонельоз, стафілококоз, кампілобактеріоз, мікоплазмоз), що спричинені мікроорганізмами, чутливими до енрофлоксацину.

Дозування

Перорально з питною водою у дозі 10 мг на кг маси тіла на добу протягом 3 діб:

свійська птиця (кури-бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк, індики) віком до 4 тижнів – 50 мл розчину на 100 л питної води;

свійська птиця (кури-бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк, індики) віком старше 4 тижнів – до 100 мл розчину на 100 л питної води.

Тривалість лікування при сальмонельозі становить 5 діб.

Кожного дня готують свіжий розчин.

Протипоказання

Підвищена чутливість до енрофлоксацину.

Не застосовувати при виявленні стійких штамів патогенних бактерій, резистентних до хінолонів. Не застосовувати одночасно з антибіотиками групи тетрацикліну, хлорамфеніколом та макролітами.

Застереження

Під час лікування тваринам дають тільки питну воду з енрофлоксацином.

Забій тварин на м'ясо дозволяється через 8 діб (кури-бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк) та 10 діб (індики) після останнього застосування препарату. Отримане до зазначеного терміну м'ясо утилізують або згодовують непродуктивним тваринам залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Флакони із коричневого скла по 100 мл.

Пластмасові флакони по 1 л.

Зберігання

Суше, темне, захищене від дітей місце в оригінальній упаковці при температурі від 5°C до 25°C.

Термін придатності – 5 років.

Після першого відбору препарат необхідно використати протягом 3 місяців за умови зберігання в оригінальній упаковці при температурі від 5 °C до 25 °C

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

КРКА, д.д., Ново место
Шмар'єшка цеста 6,
8501 Ново место,
Словенія.

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Slovenia

Виробник готового продукту

КРКА, д.д., Ново место
Шмар'єшка цеста 6,
8501 Ново место,
Словенія.

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Slovenia