

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Галлівак АЕ, Gallivac AE – вакцина жива ліофілізована проти енцефаломіеліту птиці.

Склад

Одна доза вакцини містить:

активнодіючу речовину:

вірус енцефаломіеліту птиці, штам Е10.....≥2,8 log₁₀ EID₅₀.

наповнювач.....додається до утворення 1 дози.

100 мл розчинника містить:

гліцерин.....15 мг;

деіононізована вода.....85 мг.

Фармацевтична форма

Ліофілізат та розчинник у формі розчину.

Імунобіологічні властивості

Вакцина стимулює активний імунітет птиці проти енцефаломіеліту.

Період виникнення імунітету: 3 тижні після вакцинації.

Тривалість імунітету: 10 тижнів після вакцинації.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Вакцина призначена для активної імунізації клінічно здорової птиці, починаючи з віку 10 тижнів від народження, але не пізніше ніж за 4 тижні до початку періоду несучості, проти енцефаломіеліту.

Протипоказання

Не виявлено.

Застереження при застосуванні

Вакцинують лише клінічно здорову птицю.

Під час вакцинації птиці необхідно дотримуватися правил асептики.

Вакцинувати всіх курчат одночасно.

Під час вакцинації уникати стресових ситуацій для птиці.

Взаємодія з іншими засобами

Не відома.

Особливі вказівки під час несучості

Не застосовувати протягом періоду несучості.

Спосіб застосування та дози

Вакцина застосовується перорально з питною водою або шляхом проколу перетинки крила починаючи з віку 10 тижнів від народження, але не пізніше ніж за 4 тижні до початку періоду несучості, відповідно до наступної схеми вакцинації:

Метод проколу перетинки крила:

1 флакон (500 доз) ліофілізованої вакцини розводять з 5 мл розчинника, 1 флакон 1000 доз ліофілізованої вакцини розводять з 10 мл розчинника. Вакцинують птицю методом проколу внутрішньої поверхні перетинки крила.

Метод випоювання (перорально з питною водою):

розчинити вакцину в об'ємі питної води, який споживає птиця протягом однієї - двох годин.

Напування всіх курчат проводять одночасно.

Не напувати птицю протягом двох годин перед вакцинацією.

Побічні ефекти

Не відомі.

Період виведення (каренції)

Не вакцинувати птицю за 21 добу до забою.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП

Під час вакцинації дотримуються загальних правил асептики та антисептики.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Знищити флакон та залишки вакцини відповідно до вимог місцевого законодавства.

Термін придатності

Термін придатності: 18 місяців.

Термін придатності після першого відкриття: використати відразу.

Термін придатності після розведення: використати відразу.

Умови зберігання і транспортування

Ліофілізовану вакцину зберігати та транспортувати при температурі від 2°C до 7°C у захищенному від світла та недоступному для дітей місці. Не заморожувати.

Розчинник зберігати та транспортувати при температурі від 2 °C до 25 °C у захищенному від світла та недоступному для дітей місці.

Упаковка

Скляний флакон типу 1 по 500 та 1000 доз вакцини.

Скляний флакон по 5 та 10 мл розчинника.

Коробка містить 25 по 500 доз або по 1000 доз вакцини.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

МЕРІАЛ, 29 авеню Тоні Гарнієр – 69007 Ліон, Франція.

Назва та місцезнаходження виробника

МЕРІАЛ Селект, Інк., 1168 Аеропорт Парквей, Гейнсвіль, Джорджія, 30503, США.

Правила відпуску

Без рецепту.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виники ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнологій і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламацій на біологічні препарати, що призначенні для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.