

Кокцисан® 12 %, гранули

Опис

Гранули світло-коричневого кольору діаметром 6-8 мм зі специфічним запахом.

Склад

100 г препарату містить діючу речовину:
натрію саліноміцин - 12 г.

Допоміжні речовини: карбонат кальцію, цукроза, кукурудзяний крохмаль.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP51A, препарти проти протозойних інфекцій

Натрію саліноміцин - поліефірний іоноформний антибіотик. Проникаючи у біологічну оболонку еймерій посилює проникність іонів натрію та калію, активізує Na^+ - насос та збільшує таким чином надходження Na^+ . Це гальмує участь іонів калію та натрію в метаболітичних процесах, призводить до накопичення великої кількості води у клітинах, спричиняє остаточне припинення розвитку шизонтів еймерій.

Застосування

Профілактики та лікування курей (курчата-бройлери), кіз (молодняк), кролів при ураженні еймеріями:

- курчат-бройлери: *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis*, *E. necatrix*, *E. Tenella*;
- кози (молодняк): *E. arloingi*, *E. Ninakohlyakimove*;
- кролі: *E. intestinalis*, *E. magna*, *E. perforans*, *E. Flavescens*, *E. stiedae*.

Дозування

Препарат застосовують з кормом з першої доби життя (курчата-бройлери) або від моменту відлучення від самки (кози, кролі) у дозах:

курчата-бройлери – 0,5 кг на тонну корму;

кози (молодняк) – 20,0 г на 100 кг корму;

кролі – 20-40 г на 100 кг корму.

Препарат припиняють згодовувати за 5 діб до забою.

Для забезпечення повної дисперсності препарату з кормом, його слід спочатку змішати з невеликою кількістю корму, а потім додати до решти корму.

Протипоказання

Не застосовувати одночасно з іншими кокцидіостатиками.

Не можна застосовувати тваринам за 7 діб до і після використання препарату тіамулін.

Не можна застосовувати курям-несучкам, вагітним тваринам і тваринам у період лактації.

Не можна застосовувати парнокопитим тваринам.

Застереження

Забій тварин і курчат-бройлерів на м'ясо дозволяється через 5 діб після останнього застосування препарату. До зазначеного терміну м'ясо використовують в корм хутровим звірям або на м'ясо-кісткове борошно залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Паперові пакети по 100 і 500 г. Поліетиленові мішки по 25 кг.

Зберігання

Зберігати в захищенному від світла та вологи місці при температурі не вище 25 °C .

Термін придатності - 2 роки, після першого відкриття пакету - 6 місяців.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення та виробник продукту:

KRKA, d.d., Ново місто
Шмар'єшка цеста 6,
8501 Ново місто,
Словенія.

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Slovenia