

ЗАТВЕРДЖУЮ



Головного державного
ветеринарного інспектора України
Л.М. Мухарська
2005 р.

РЕГЛАМЕНТ

із застосування родентицидного засобу
"СМЕРТЬ ЩУРАМ №1" для знищення пацюків та мишей

1. Загальні положення

1.1. Повна назва засобу: родентицидний засіб " СМЕРТЬ ЩУРАМ №1".

1.2. Фірма-виробник: ТОВ СП "Італ Тайгер" (Україна, м. Дніпропетровськ).

1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин: антикоагулянт бродифакум – 0,005 % (діюча речовина); харчова приваблююча основа – 78,7 %, інші допоміжні речовини до 100 %.

1.4. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу: принада "СМЕРТЬ ЩУРАМ №1" являє собою м'яку тістоподібну масу темно-синього або червоного кольору (в залежності від використаного барвника) зі слабким запахом. Засіб розфасовано по 5,0 г, 10,0 г, 12,5 г у фільтр-пакетики. Засіб відноситься до негорючих продуктів.

1.5. Призначення засобу: для знищення сірих та чорних пацюків і хатніх мишей фахівцями дератизаційної служби в організаціях і установах різного призначення, на забудованій та незабудованій території населених пунктів (у місцях, не доступних для дітей і нецільових тварин) та у побуті.

1.6. Специфічні біологічні властивості засобу: родентицидні властивості засобу "СМЕРТЬ ЩУРАМ №1" обумовлює діюча речовина бродифакум – антикоагулянт 2-го покоління активний проти гризунів, резистентних до інших антикоагулянтів. Вплив бродифакуму на організм гризуна типовий для антикоагулянтів: знижує зсідання крові та збільшує проникність кровоносних судин, внаслідок чого виникають внутрішні та зовнішні кровотечі, які поступово призводять до загибелі уражений організм. Уповільнений розвиток симптомів отруєння запобігає виникненню у гризунів побоювання до сприйняття принади, захисні реакції у тварин не формуються, перестороги до засобу не виникає.

1.7. Токсичність та небезпечність засобу: бродифакум відноситься до речовин надзвичайно небезпечних (згідно з ГОСТ 12.01.007-76 1 клас небезпеки). LD_{50} бродифакуму при введенні у шлунок білих щурів складає 0,3 мг/кг. Володіє вибірковою токсичністю, відноситься до висококумулятивних речовин. Ступінь токсичності засобу для теплокровних порівняно невеликий (4 кл. небезпеки згідно з ГОСТ 12.01.007-76), проте, він дуже небезпечний при систематичному надходженні до організму людини. Місцево-подразнювальних та сенсibilізуючих властивостей не має. Не шкідливий при інгаляційному надходженні.

2. Спосіб застосування засобу

2.1. Для досягнення максимальних результатів перед початком проведення дератизаційних робіт необхідно обстежити територію, яка підлягає обробці, з метою визначення зони активності та кількості гризунів за слідами їхньої життєдіяльності (свіжий слід, погризи, нори тощо), а також вибрати найкращі точки для розміщення принади в місцях укриття та харчування гризунів.

2.2. Фільтр-пакетики (не розгортаючи) розкладають за допомогою пінцету або пластикової ложки у неглибоку спеціальну або пристосовану для цього тару з жерсті, поліетилену, картону по 1 пакетик масою 10,0г, 12,5г або 2 пакетики масою 5,0г для мишей та по 2-3 пакетики масою 10,0г, 12,5г або 4-6 пакетиків масою 5,0г для знищення пацюків.

2.3. Розкладену принаду розміщують під укриттям з дошок, в обрізки труб, коробки, або, що краще, в спеціальні ємності для отруйних принад. Це дозволяє ефективно працювати із засобом під час контролю за його поїданням та швидко збирати рештки після закінчення дератизаційних робіт.

2.4. Ємності з принадою розташовують у попередньо визначених місцях активності гризунів (біля нир, на основних шляхах їх переміщення, вздовж стін та перегородок) на відстані 2-15 м в залежності від чисельності та виду гризунів та захищеності приміщення. В зоні активності мишей тару з принадою розкладають якнайбільше.

2.5. Контроль за поїданням принади здійснюють до двох тижнів з інтервалом у 4-5 діб. Якщо принада з'їдена, то додають нові порції, якщо пакетики не займані, то їх переносять в інше місце.

2.6. Принада "СМЕРТЬ ЩУРАМ №1" приваблива для гризунів. Після її споживання загибель тваринок починається за 3-4 дні. Остаточний ефект настає за 6-10 днів.

2.7. Непридатні до повторного використання рештки засобу разом з місткостями підлягають подальшій утилізації.

3. Застережні заходи

3.1. Родентицидний засіб "СМЕРТЬ ЩУРАМ №1" є небезпечним для людей та тварин. З метою попередження випадкового отруєння необхідно виключити можливість його попадання до організму людини. Слід дотримуватися заходів безпеки.

3.2. До роботи із засобом допускаються особи не молодші 18 років, які не страждають захворюваннями крові та печінки та пройшли спеціальну підготовку та інструктаж.

3.3. Під час роботи із засобом використовують гумові рукавички, спецодяг (халат, косинка), допоміжні інструменти (щипці для збору загиблих гризунів, поліетиленова тара).

3.4. При роботі із засобом необхідно дотримуватися правил особистої гігієни: не курити, не пити, не вживати їжу. Після завершення будь-яких робіт із засобом слід ретельно помити руки з милом.

3.5. Забруднений спецодяг замочують у мильно-содовому розчині протягом 5-6 годин з наступним пранням з миючими засобами.

3.6. Принаду розкладають у місцях, недоступних для дітей та домашніх тварин.

3.7. Особи, які працюють або проживають на оброблених об'єктах, повинні бути поінформовані щодо наявності родентициду та заходів безпеки.

3.8. По закінченні дератизації зібрані ємності та залишки принади (якщо вони не придатні для використання вдруге), а також мертвих гризунів слід спалити. Труп гризунів на об'єктах збирають за допомогою щипців або руками, захищеними гумовими рукавичками.

3.9. По завершенні робіт використані інструменти, рукавички помити мильно-содовим розчином (25,0г мила та 5,0г кальцинованої соди на 1 л води), потім промити чистою водою.

4. Заходи першої допомоги при отруєнні

4.1. При випадковому надходженні засобу "СМЕРТЬ ЩУРАМ №1" до організму людини може виникнути отруєння. Потерпілого слід негайно усунути від контакту з родентицидом та прийняти належні заходи щодо виведення отрути з організму.

4.2. У випадку потрапляння засобу в шлунок потерпілому необхідно дати випити кілька склянок теплої води, після чого викликати блювання шляхом механічного подразнення задньої стінки глотки. Процедуру повторити! Після чого дати активоване вугілля та соляний проносний засіб (1 ст. ложка магnezії на 1 склянку води). Після всіх процедур потерпілому дати міцний солодкий чай з аскорбіновою кислотою. Після надання першої допомоги потерпілий повинен звернутися до лікаря.

4.3. При попаданні засобу на шкіру забруднене місце промити водою з милом. При попаданні на слизові оболонки очей негайно промити їх великою кількістю води.

4.4. Збільшення тенденції до кровотечі з носа та ясен при роботі із засобом "СМЕРТЬ ЩУРАМ №1" вимагає негайного звернення до лікувального закладу, при собі мати етикетку засобу. Антидот – вітамін К₁ (фітоменадіон), приймати який треба за вказівками лікаря та під контролем протромбіна в крові.

5. Пакування. Транспортування. Зберігання

5.1. Пакування: принада масою 5,0 г, 10,0 г і 12,5г розфасована у фільтр-пакетики, потім у герметичні двошарові пакети з полімерної плівки масою 50 г, 100 г, 200 г, 250 г, 300 г, 500 г, 1 кг та 3 кг або у відра полімерні герметичні масою 1 кг, 2 кг, 2,5 кг, 3 кг, 3,5 кг, 4 кг, 5 кг, 6 кг, 7 кг, 8 кг, 9 кг, 10 кг, 11 кг. Пакети заповані у коробки з гофрованого картону масою не більше 15 кг.

5.2. Засіб "СМЕРТЬ ЩУРАМ №1" транспортують в упаковці підприємства-виробника згідно з правилами перевезень небезпечних вантажів на автомобільному та залізничному транспорті.

5.3. Зберігають засіб в упаковці виробника у сухому темному приміщенні, призначеному для зберігання отрутохімікатів, або у спеціальній зачиненій шафі при температурі від 0 до 30 °С. Необхідно вести облік засобу шляхом реєстрації у відповідному журналі надходження та витрати засобу.

Термін придатності – 12 місяців з дати виготовлення.
Токсично!