



Додаток 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00492-02-12
від 06.07.2012

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Немовак, Nemovac – вакцина жива ліофілізована проти пневмовірусної інфекції птиці.

Склад

Одна доза вакцини містить:

активнодіюча речовина:

атенуйований вірус рінотрахеїту, штам PL21..... не менше $10^{2.3}$ ККІД₅₀;
наповнювач.....додають до утворення 1 дози.

Фармацевтична форма

Ліофілізат бежевого кольору.

Імунобіологічні властивості

Вакцина стимулює активну імунізацію проти пневмовірусної інфекції птиці і діє як засіб контролю респіраторної хвороби курей, асоційованої з цим вірусом (синдром опуклої голови).

Період виникнення імунітету: 17 діб після вакцинації.

Тривалість імунітету: протягом 3 тижнів.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Вакцина призначена для активної імунізації проти пневмовірусної інфекції птиці і діє як засіб контролю респіраторної хвороби курей, асоційованої з цим вірусом (синдром опуклої голови).

Протипоказання

Не вакцинувати птицю в період несучості.

Застереження при застосуванні

Вакцинують виключно клінічно здорову птицю.

Під час вакцинації птиці необхідно дотримуватися правил асептики.

Взаємодія з іншими засобами

Не виявлено.

Особливі вказівки під час несучості

Не застосовувати.

Спосіб застосування та дози

Вакцину застосовують відповідно до наступної схеми вакцинації:

бройлери: - одна доза вакцини застосовується у віці від 7 до 14 діб від народження.

ремонтний молодняк курей-несучок та кури-несучки: - одна доза вакцини застосовується у віці 10 тижнів від народження, ревакцинацію проводять інактивованою вакциною до початку періоду несучості.

Використовуйте відразу після розчинення вакцини у чистій питній воді, що не містить дезінфектантів та антисептичних засобів.

- Оральний метод

Розчинити вакцину в об'ємі чистої питної води, який споживається птицею протягом однієї, двох годин.

Перед вакцинацією не напувати птицю протягом двох годин.

Побічні ефекти

Не виявлено.

Період виведення (каренції)

Немає.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВП

Під час вакцинації дотримуються загальних правил асептики та антисептики.

Рекомендується одягнути захисні рукавички під час роботи з вакциною.

Після роботи з вакциною вимити та продезінфікувати руки.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Знищити флакон та залишки вакцини відповідно до вимог місцевого законодавства.

Термін придатності

24 місяці.

Термін придатності після першого відкриття: використати відразу.

Термін придатності після розведення: використати відразу.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати та транспортувати за температури від 2 °С до 8 °С у місці, захищеному від світла.

Упаковка

Скляні флакони по 1000 доз та 5000 доз.

Пластикова упаковка містить по 10 скляних флаконів.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

МЕРІАЛ, 29 авеню Тоні Гарнієр – 69007 Ліон, Франція.

Назва та місцезнаходження виробника

МЕРІАЛ (Лабораторія Порте дес Алпес), руе де л'Авіеший – 69800 Сейнт Прієст, Ліон, Франція.

Правила відпуску

Без рецепту.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.