

Коротка характеристика препарату

1. Назва

СтреснілTM

2. Склад

1 мл препарату містить діючу речовину (мг):

азаперон 40,0.

Допоміжні речовини: винна кислота, натрію метабіульфіт, натрію гідроксид, етиловий ефір 4-гідроксибензоат, пропілпарабен, вода для ін'єкцій.

3. Фармацевтична (лікарська) форма

Розчин для ін'єкцій.

4. Фармакологічні властивості

ATC-vet класифікаційний код: QN01 Анестетики.

СтреснілTM — седативний нейролептик з α-адреноблокуючими властивостями.

При внутрішньом'язовому введенні діє седативно без застосування наркозу.

Рівень седативного ефекту залежить від дози препарату. Заспокійлива дія проявляється при дозі 0,5 мг азаперону на 1 кг маси тіла. Збільшення дози до 2 мг азаперону на 1 кг маси тіла тварини спричиняє сонливість впродовж 2 годин після застосування.

Азаперон всмоктується швидко після введення препарату та концентрується в плазмі крові протягом першої години після ін'єкції. Метаболізм діючої речовини відбувається в печінці.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Свині.

5.2 Показання до застосування

Застосовується для профілактики та лікування свиноматок, поросят при агресивності після перегрупування; стресовому стані (транспортування, опорос, оперативне втручання); патологічному напруженні; для премедикації перед застосуванням місцевої або загальної анестезії; підсилення дії анестезії.

5.3 Протипоказання

При застосуванні препарату необхідно уникати низької температури приміщення, де утримуються тварини, оскільки можливим є ризик виникнення серцево-судинної недостатності через периферійну вазодилатацію.

Не застосовувати препарат для свиней на забій менше ніж за 16 діб до забою.

5.4 Побічна дія

Немає даних.

5.5 Особливі застереження при використанні

Застосовувати препарат внутрішньом'язово, введенням у ділянку шиї за вухом.

Для введення препарату використовують голку для підшкірних ін'єкцій. Голку вводять у ділянку за вухом перпендикулярно до поверхні шкіри. Якщо існує ризик введення розчину в жирову тканину, необхідно застосовувати коротку голку та вводити препарат повільно.

Після застосування препарату необхідно утримувати тварину в тихому приміщенні та забезпечити спокій після ін'єкції.

5.6 Використання під час вагітності, лактації

Без особливостей.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Уникати змішування в одному шприці з іншими препаратами.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Препарат застосовують внутрішньом'язово у ділянку шиї за вухом.

Для попередження та контролю агресивності у поросят після перегрупування та свиней на відгодівлі застосовують 1 мл препарату на 20 кг маси тіла. Свині від різних

приплодів можуть бути об'єднані в одну групу одразу після застосування препарату СтреснілTM.

Для лікування свиноматок при агресії застосовують 1 мл препарату на 20 кг маси тіла. Через годину після введення поросята можуть допускатися до свиноматки.

У випадку надмірної збудженості, нервозності чи перевантаження серця застосовують 1 мл препарату на 100 кг маси тіла. Необхідно забезпечити повний спокій тварині після введення впродовж декількох хвилин.

Для зниження стресу у кнурів перед транспортуванням вводять 0,5 мл препарату на 20 кг маси тіла за 15-30 хвилин до транспортування.

Для зменшення стресового стану тварини під час опоросу, оперативного втручання, при наявності патологічної напруги вводять 1 мл препарату на 20 кг маси тіла тварини.

Перед місцевою і загальною анестезією та для її посилення вводять 0,5-1 мл препарату на 20 кг маси тіла.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Передозування може спричинити короткотривале слизовиділення та незначну задуху.

5.10 Спеціальні застереження

Немає.

5.11 Період виведення (каренції)

Забій тварин на м'ясо, що призначено для споживання в їжу людям, дозволяється через 16 діб після застосування препарату. До зазначеного терміну продукцію утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, відповідно до висновку лікаря ветеринарної медицини.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

СтреснілTM має седативну дію на людину, тому необхідно уникати самоін'екції.

Після роботи з препаратом необхідно вимити руки з милом.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Не відомі.

6.2 Термін придатності

36 місяців.

1 місяць після першого відбору із флакону.

6.3 Особливі заходи зберігання

Сухе захищене від світла, недоступне для дітей та домашніх тварин, місце в упакуванні виробника при температурі від 15 до 30°C.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Скляні безбарвні флакони по 100 мл.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний препарат або його залишки мають бути утилізовані згідно чинних вимог.

7. Назва і місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Елі Ліллі Реджіонал Оперейшنس ГмбХ,

Eli Lilly Regional Operations Ges.m.b.H.,

Еланко Енімал Хелс

Elanco Animal Health

Колблгассе 8-10, А-1030, Віденсь

Kolblgasse 8-10, A-1030, Wien

Австрія

Austria

8. Назва і місцезнаходження виробника

Санохемія Фармацеутіка А.Г.

Sanochemia Pharmazeutika AG

Ландеггер Штрассе 7

Landagger Strasse 7,

А-2491 Нейфельд/Лейта

A-2491 Neufeld/Leitha

Австрія

Austria

9. Додаткова інформація