

Коротка характеристика продукту

1. Назва

ГЕПАРЕНОЛ

2. Склад

100 мл кормової добавки містять діючі речовини (г):

сорбітол 35,0;

ацетил метіонін 10,0.

Допоміжні речовини: холін хлорид, бетаїн, L-лізин гідрохлорид, натрій метилпарагідроксibenзоат, рідкий екстракт артишоку, рідкий екстракт тирличу, рідкий екстракт больдо, натрій гідроксид, яблучний ароматизатор.

3. Фармацевтична (лікарська) форма

Розчин для перорального застосування

4. Фармакологічна дія

ГЕПАРЕНОЛ проявляє сукупні фармакологічні властивості окремих компонентів.

Метіонін — донатор метильних груп для синтезу холіну і фосфоліпідів біологічних мембран на клітинному та субклітинному рівнях. Із нейтрального жиру і холіну в печінці утворюються холінофосфатиди, чим забезпечується постійний відплив жиру з печінки і попереджується жирова дистрофія гепатоцитів. Окрім того, метіонін бере участь у синтезі адреналіну, креатину, активує дію ряду гормонів, ферментів, вітамінів В₁₂, В_с і С, знешкоджує токсичні речовини.

Сорбітол — енергетична речовина, накопичується в печінці у формі глікогену, частково компенсує негативний енергетичний баланс, має виражений сечогінний ефект.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Коні, велика рогата худоба, вівці, кози, свині, свійська птиця, кролі.

5.2 Показання до застосування

ГЕПАРЕНОЛ згодують тваринам для зменшення ризику виникнення жирової гепатодистрофії, гепатиту, стимуляції жовчовидільної функції печінки, що поліпшує перетравлення жирів та засвоєння жиророзчинних вітамінів. Особливо необхідна кормова добавка у період максимальної продуктивності тварин та при зміні складу раціону.

5.3 Протипоказання

Даних немає.

5.4 Особливі застереження при використанні

Надмірно довге застосування може призвести до діареї.

5.5 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Без особливостей.

5.6 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Даних немає.

5.7 Дози і способи введення тваринам різного віку

Гепаренол додають у корм або питну воду, у розрахунку 1-2 мл добавки на 10 кг маси тіла тварини, впродовж 5-10 діб у дозах:

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| велика рогата худоба, коні | - 20-50 мл на 1 тварину на 1 добу; |
| вівці, кози, телята | - 5-15 мл на 1 тварину на 1 добу; |
| свині | - 10-30 мл на 1 тварину на 1 добу; |
| кролі, свійська птиця | - 1-2 мл на 1 л питної води. |

5.8 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Можлива поява діареї.

5.9 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Немає.

09.03.2016

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Термін придатності

24 місяці.

6.2 Особливі заходи зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце при температурі від 2 до 25 °С.

6.3 Природа і склад контейнера первинного пакування

Пляшка із високощільного поліетилену об'ємом 1 або 5 л із герметичною кришкою.

6.4 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним продуктом або із його залишками

Невикористаний продукт або його залишки утилізують згідно з чинними вимогами.

7. Назва і місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

МЕРІАЛ

29 авеню Тоні Гарнієр -

69007 Ліон,

Франція

MERIAL

29 avenue Tony Garnier -

69007 Lyon,

France

8. Назва і місцезнаходження виробника

МЕРІАЛ

23 rue дю Прієре,

44150 Сейнт-Герблон,

Франція

MERIAL

23 rue du Prieure,

44150 Saint-Herblon,

France

9. Додаткова інформація