Додаток 2
до реєстраційного посвідчення АА-04972-01-13

06.04.2016

Суановіл 50
(порошок для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис
Водорозчинний порошок від білого до жовтуватого кольору.
Склад
100 г препарату містить діючу речовину:
спіраміцин (у формі адипату) - 150 млн МО.
Допоміжна речовина: лактоза моногідрат.
Фармакологічні властивості
ATC vet класифікаційний код QJ01 – антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування.

Спіраміцин є бактеріостатичним антибіотиком, який належить до групи макролідів. Він пригнічує синтез протеїнів, зв'язуючись з 50S-рибосомальною субодиницею рибосом бактерій. Крім того, спіраміцин інгібує адгезію бактерій до епітеліальних клітин (особливо грампозитивних коків, таких як *Staphylococcus* та *Streptococcus spp.)*, та стимулює фагоцитарні властивості багатоядерних нейтрофілів. Спіраміцин має імуномоделюючі та помірно протизапальні властивості.

Спіраміцин діє проти грампозитивних бактерій та мікоплазм, а також проти деяких грамнегативних бактерій *(Staphylococcus spp., Pasteurella spp., Streptococcus spp., Enterococcus spp., Neisseria intracelularis, Listeria monocytogenes, Corynebacterium diphteriae, Mycoplasma spp., Clostridium spp., Bacteroides spp., Haemophilus spp., Treponema pallidum, Brucella spp., Treponema microdentium, Leptospira icterohemorragiae, Rickettsia spp.).*

Після прийому, спіраміцин швидко всмоктується через травний канал та розподіляється в тканинах, має добру внутрішньоклітинну проникність. Найвищу концентрацію спіраміцину спостерігають у легенях, селезінці, нирках, печінці та кістках. Спіраміцин проникає крізь плацентарний бар'єр та виявляється в молоці. Спіраміцин незначно та повільно метаболізується печінкою, шляхом гідролізу в неоспіраміцин. Близько 80% введеної дози виводиться з жовчю. Може мати місце ентерогепатичний рециклінг. Уринарна екскреція від 4 до 14% від введеної дози.

Застосування
Лікування телят віком до 3-х місяців, свиней, свійської птиці (кур-бройлерів, гусей, індиків, качок) при захворюваннях органів дихання та травного каналу, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до спіраміцину.

Дозування
Перорально з питною водою, молоком або рідким кормом у наступних дозах:
телята віком до 3-х місяців - 1 г препарату на 10 кг маси тіла на добу протягом 3-5 діб;
свині - 0,66 г препарату на 10 кг маси тіла на добу протягом 3-5 діб;
свійська птиця (кури-бройлери, гуси, індики, качки) - 1 г препарату на 1л питної води на добу протягом 3-5 діб.

Протипоказання
Не застосовувати при підвищеній чутливості до спіраміцину або інших макролідів.
Не застосовувати курям-несучкам, яйця яких використовують в їжу людям (протягом 4 тижнів до та під час періоду несучості).

Застереження
Порошок для перорального застосування призначений для розведення з питною водою, молоком або рідким кормом і не може бути застосований самостійно.

Забій тварин та свійської птиці на м`ясо дозволяють через 21 добу (телята, свині) та 10 діб (кури-бройлери, гуси, індики, качки) після останнього застосування препарату. Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

06.04.2016

Дотримуватися всіх рекомендацій щодо заходів безпеки, використовуючи захисний одяг, окуляри, рукавиці та маску. Уникати вдихання порошку і прямого контакту зі шкірою та очима.

У разі появи таких симптомів, як шкірний висип, звернутися до лікаря і показати йому листівку-вкладку. Набряки на ділянці обличчя, повік, губ або ускладнене дихання є важкими симптомами і вимагають термінової медичної допомоги.

Уникати контакту з препаратом або його розчином особам з гіперчутливістю до спіраміцину.

Форма випуску

Алюмінієві коробки по 100 г та 1 кг.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 2 ^{0}C до 25 ^{0}C.

Термін придатності: 36 місяців.

Термін придатності після першого відкриття: 3 місяці за умови зберігання за температури від 2 ^{0}C до 25 ^{0}C.

Термін придатності після розведення: 24 години.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

МЕРІАЛ,
29 авеню Тоні Гарнієр - 69007 Ліон,
Франція

MERIAL,
29 avenue Tony Garnier - 69007 Lyon,
France

Виробник готового продукту

МЕРІАЛ,
23 руе дю Прієре, 44150 Сейнт-Герблон,
Франція

MERIAL,
23 rue du Prieure, 44150 Saint-Herblon,
France